继发性红细胞增多症 CT 表现 1 例

左育宏¹, 李屹², 杜富猛², 张涛², 焦俊^{1*}

(1. 贵阳医学院附院 影像科, 贵州 贵阳 550004; 2. 贵阳医学院附属白云医院 影像科, 贵州 贵阳 550004)

[关键词] 红细胞增多症, 真性; 体层摄影术, X线计算机; 血管; 血液

[中图分类号] R551 [文献标识码] B [文章编号] 1000-2707(2014)05-0780-02

继发性红细胞增多症是由于长期组织缺氧、机体促红细胞生成素(EPO)分泌增高,进而使红细胞生成增加,以至于单位体积的外周血中红细胞数、血红蛋白及血细胞比容高于正常^[1]。红细胞增多症的诊断多可依据实验室检查确诊,有关其CT表现国内少有报道,对真性红细胞增多症的诊断标准也多是对血液的实验室检查,骨髓检查,影像学仅显示脾肿大。2013年7月收治1例继发性红细胞增多症患者,对其进行头、胸、腹CT检查,发现血管内流体组织^[2]密度明显增高这一特有的现象,报告如下。

1 临床资料

患者男,18岁。5岁时诊断先天性心脏病室间隔缺损,有口唇发绀、杵状指等体征,经常鼻衄,胸骨左缘第3、4肋间可闻及收缩期杂音。2013年7月因外伤后行头部和胸、腹部CT平扫检查,发现颅内及胸、腹部较大血管内血液密度明显高于正常,类似CT增强扫描表现。头部CT平扫:双侧颈内动脉、颅内动脉及静脉清晰显示(图1),血管中心流体CT值约60~75HU,大脑浅表小血管显示清晰(图2)。胸、腹部CT平扫:胸腔大血管、心脏房室腔、腹主动脉、双侧肾动静脉、下腔静脉及门静脉等血液密度均明显增高,血管中心CT值约55~70HU(图3),心脏超声室间隔肌部回声缺失,宽径约42mm。多次血常规检查:红细胞计数($7.35 \sim 8.02$) $\times 10^{12}/L$,血红蛋白244~256g/L,红细胞压积67.00%~73.70%。临床诊断先天性心脏病室间隔缺损和继发性红细胞增多症。

2 讨论

红细胞增多症是指单位体积的外周血中红细胞数、血红蛋白及血细胞比容等数值高于正常指标^[3],分为相对性和绝对性两类,前者是指由于血浆容量减少,使红细胞容量相对增加,因而单位体积的红细胞数增多,但全身红细胞总容量无改变,常因为剧烈腹泻、呕吐、大量出汗、休克、烧伤、使用利尿剂等引起,情绪激动、肥胖、高血压、吸烟、饮酒等因素也可引起相对性红细胞比容增多,所以又称为“应激性”红细胞增多症^[3];绝对红细胞增多症是由于红细胞数量绝对值增加,红细胞比容增大,血容量也增多,又可分为原发性和继发性。原发性红细胞增多症又称为真性红细胞增多症,其特征为外周血中红细胞数显著增高,通常伴有白细胞和血小板增多、脾大^[3];继发性红细胞增多症多见于儿童及青少年,起病隐匿,偶尔在血细胞检测时发现,2.40%患者浴后出现皮肤瘙痒(组胺浓度高所致),还可见皮肤和黏膜显著红紫,尤以面颊、唇、舌、耳、鼻咽、颈部和上肢末端(指趾及大小鱼际)为甚,眼结膜可显著充血;25%病人有鼻衄、牙龈出血表现^{[1][3]}。

有关CT对血液密度变化报道不多,尤其是对血管内密度增高原因的分析更少,文献主要是通过血液CT值减低判断贫血程度方面的研究^[4]。血液中红细胞对X线衰减的主要影响因素是细胞中的含铁血蛋白^[5],血红蛋白含量越高,血液密度及CT值越高,Foster认为Hb每增加4.35g/L,血液流体CT值升高1HU^[6]。

*通信作者 E-mail:jiaojuns@hotmail.com

网络出版时间:2014-09-23 网络出版地址: <http://www.cnki.net/kcms/detail/52.5012.R.20140923.1644.018.html>

图 1 双侧颈内动脉,大脑前、中、后动脉及乙状窦密度增高,CT 值 68 ~ 70 HU

Fig. 1 The density of bilateral internal carotid artery, anterior, middle, posterior, cerebral artery, and sigmoid sinus increased, and the CT value was 68 ~ 70 HU

图 2 脑沟内大脑浅表动脉 CT 值 64 ~ 69 HU, 左前额可见皮下血肿影

Fig. 2 The cerebral superficial artery in the sulcus obviously developed, and the CT value was 64 ~ 69 HU, subcutaneous hematoma image in left forehead was visible

该患者有室间隔缺损,长期处于慢性缺氧状态,多次血常规检查 Hb、红细胞压积、红细胞计数均有显著增高,应属绝对、继发性红细胞增多症。由于对红细胞增多症的病理学和影像学特点缺乏足够的认识,在 CT 平扫发现血管内流体密度增高时不能及时理解。CT 平扫时,血管内血液密度 CT 值为 13 ~ 32 HU^[4]的情况下不能显影,或仅局部显影。该患者头、胸腹部血管 CT 检查时清晰显示,

图 3 腹主动脉、双肾动静脉、下腔静脉等血管内密度增高

Fig. 3 The density of abdominal aorta, bilateral renal arteriovenous, inferior vena cava increased

双侧颈内动脉、颅内动脉及静脉清晰显示,血管中心流体 CT 值为 60 ~ 75 HU,类似于增强扫描征象;胸腔大血管、心脏房室腔、腹主动脉、双侧肾动静脉、下腔静脉及门静脉等血管内血液密度均明显增高,脑沟、脑池及静脉窦等血管密度增高,CT 检查时血管内流体密度增高的现象与患者长期缺氧,红细胞和红细胞内含铁血蛋白绝对值增加有关。因此,当发现血管内流体密度增高时,应考虑有各种原因导致的红细胞增多症,需要密切结合临床及相关实验室检查作出进一步分析和鉴别诊断。

3 参考文献

- [1] 王文荣,李秋芬. 血液透析患者伴继发性红细胞增多症 12 例[J]. 实用医药杂志, 2012(23):3963 - 3964.
- [2] 王文耕,丘冰青,黄颖臻,等. 肝毒治疗慢性肺脏疾病所致继发性红细胞增多症[J]. 现代医院, 2008(1):29 - 30.
- [3] 王季石. 新编实用血液病学[M]. 贵阳:贵州人民出版社, 2011:115.
- [4] 张玉忠,张雪林,张文生. 等. 胸部非增强 CT 评价贫血的准确性[J]. 中华放射学杂志, 2006(40):1070.
- [5] 周爱儒. 生物化学. 5 版. 北京:人民卫生出版社, 2001: 346 - 363.
- [6] Foster M, Nolan RL, Lan M. prediction of anemia on unenhanced computed tomography of the thorax[J]. Can Assoc Radiol J, 2003(54):26 - 30.

(2014-08-09 收稿,2014-09-13 修回)

编辑:潘 娅