肺恶性孤立性纤维性肿瘤 1 例

刘浪波, 王涛*, 张舰, 林鹏, 肖家荣

(贵州医科大学附院 胸外科, 贵州 贵阳 550004)

[关键词] 肺肿瘤; 孤立性纤维性肿瘤; 免疫组织化学; 手术治疗

[中图分类号] R734.2 [文献标识码] B [文章编号] 1000-2707(2015)11-1280-01

孤立性纤维性肿瘤 (Solitary fibrous tumor, SFT) 是一种临床上少见的梭形细胞肿瘤, 几乎可以发生于全身任何部位, 尤其好发于胸腹腔; 发病年龄 6~70 岁, 男女均可发病^[1]。现报道肺孤立性纤维性肿瘤 1 例。

1 临床资料

患者男, 33 岁, 体检发现右肺门占位, 查体未见明显异常。X 线胸片示右肺门区团块状高密度影, 边界较清楚 (图 1A); 胸部 CT 增强显示右肺门团块状密度增高影, 截面 5.7 cm × 5.0 cm, 边界较清楚, 增强后不均匀轻中度强化, CT 值 83 Hu (图 1B)。相关检查并排除手术禁忌症后, 在全麻下行右全肺切除术, 取右后外侧切口逐层切开皮肤和组织, 经第 5 肋间进胸, 术中探查见肿瘤位于右中肺近肺门处, 大小约 6 cm × 6 cm × 5 cm, 质硬, 不活动, 边界不清, 已累及脏层胸膜; 进一步探查发现右肺动脉干内瘤栓形成, 行右全肺切除术完整取出右全肺 (右肺动脉干内见约 6 cm × 2 cm × 2 cm 的瘤栓, 质硬), 术中病理冰冻切片结果示: 肺梭形细胞瘤; 清扫第 2、3、4、7、10 及 11 组淋巴结共 25 枚, 术中探查右主支气管残端未见肿瘤累及。术后给予止血、抗炎、抑酸及补液等治疗。术后病理检查结果示右全肺梭形细胞肿瘤, 病理性核分裂计数 3~4 个/10 HP (图 1C); 第 3、4、7、10 及 11 组淋巴结均未见肿瘤细胞, 第 2 组淋巴结为纤维脂肪组织, 未见肿瘤。肿瘤组织免疫组织化学结果示: CK⁻, EMA⁻, Vim⁺, CD99⁺, bcl-2⁺, CD34 部分阳性, S-100 灶⁺, SMA⁻, Desmin⁻, Ki67 比例为 20%, 支持肺恶性孤立性纤维性肿瘤诊断 (图 1D)。患者

术后第 6 天拔出胸管, 术后第 9 天出院, 电话随访 6 个月, 情况良好。

2 讨论

SFT 几乎可以发生于全身任何部位, 有研究认为 SFT 起源于一种 CD34 阳性的树突状间叶细胞^[2], SFT 主要依赖病理学及免疫组织化学法确诊。病理学可见肿瘤切面多呈灰白色, 质中, 包膜完整或不完整, 部分局灶有黏液变性、坏死或钙化^[3]; 镜下见肿瘤细胞较单一, 由梭形、短梭形及卵圆形细胞组成, 可见交替分布的细胞富集区和细胞稀疏区, 其间有不同比例的胶原纤维, 部分区域间质血管较丰富。典型的免疫组化特征为 CD34、bcl-2 和 CD99 阳性, 而 SMA、Desmin 阴性, 本例患者免疫组化结果与此标准相符。影像学检查有如下征象考虑 SFT 可能: 病灶 X 线示边界清楚, 体积较大; CT 密度不均匀, 与胸膜宽基底相连, 临近骨质无破坏, 病灶呈轻到中度强化; MRI 上 T2WI 呈不均匀等低信号^[3]。本病例 CT 表现与该标准相符。多数 SFT 为良性, 表现为局部缓慢生长无痛肿块, 没有症状或症状不明显^[4]。SFT 缺乏典型临床表现, 可表现为咳嗽、胸痛及呼吸困难等非特异性症状, 症状严重程度与肿瘤大小及肿瘤良恶性相关; 最常见有肥大性肺骨关节病和严重的症状性低血糖, 恶性肿瘤患者更易出现症状^[5]。SFT 肿瘤较大时可以压迫患者肺组织, 表现为叩诊为浊音, 呼吸音降低, 闻及哮鸣音等^[1]。肺部 SFT 以手术切除为主, 直径小于 5 cm 且为周围型者可用胸腔镜手术切除, 稍大者采用胸腔镜辅助小切口手术切除, 较大或中央型肿瘤者则需常规开胸手术切除,

(下转第 1282 页)

* 通信作者 E-mail: wangtao2877@qq.com

网络出版时间: 2015-10-13 网络出版地址: <http://www.cnki.net/kcms/detail/52.5012.R.20151013.1141.002.html>

死。另外,医务人员未详细询问其受伤机制,单纯通过 X 线检查了解患者损伤情况,造成医疗事故。在医疗损害鉴定过程中,鉴定人员详细询问病史,其受伤机制为两车相撞,左脚踏踩离合器,巨大外力传导至髌关节导致骨折、脱位,此种类型多伴有严重的软组织损伤,若术前能通过 CT 或 MRI 检查明确软组织损伤情况,确定手术时机和手术方式,术中 C 臂透视,可能效果会更好。

髌白的复杂骨折合并股骨头后脱位,若合并重要的神经和血管损伤,往往容易导致股骨头缺血性坏死。如诊治过程中出现的问题及并发症发生,大多与临床医师处理不当有关^[8]。本案例医方存在询问病史不仔细,对患者受伤机制不清,局部组织损伤的严重性估计不足,术前检查不全面,内固定物选择欠妥、术后复查不及时等诸多不足,与患者股骨头坏死之医疗损害间存在直接因果关系;考虑到患者左髌关节损伤严重,外力作用巨大,髌白骨折严重、治疗上存在一定困难,判定院方在本例股骨头坏死中的参与度为 50%。后根据信息反馈,法院已采信本鉴定结论。

3 参考文献

- [1] 范道勇,王绍均,何波,等. 髌白骨折手术治疗方法的选择[J]. 中国伤残医学, 2014(3):3-4.
- [2] 孟纬,潘昊鹏,吕庆生,等. 合并后壁骨折的复杂性髌白骨折手术疗效分析[J]. 实用骨科杂志, 2015(3):207-209.
- [3] 张发平,李玉桥,罗仕武,等. 手术治疗髌白骨折的临床疗效[J]. 临床骨科杂志, 2014(4):422-425.
- [4] 吴浩源. 手术治疗髌白骨折 52 例临床体会[J]. 现代诊断与治疗, 2013(18):4216-4217.
- [5] 王贺平. 髌白骨折 60 例手术治疗分析[J]. 河南医学研究, 2014(6):61-62.
- [6] 赵勇. 锁定加压钢板内固定术治疗复杂性髌白骨折疗效观察[J]. 山东医药, 2012(22):79-80.
- [7] 江亚,段廷明,杨祖华,等. 髌白骨折手术治疗的临床研究[J]. 南昌大学学报:医学版, 2014(1):46-48.
- [8] 黄文雅,陈锦凤. 髌白后壁骨折合并髌关节后脱位诊疗失误及并发症分析[J]. 齐齐哈尔医学院学报, 2014(19):2874-2875.

(2015-08-13 收稿,2015-09-22 修回)

编辑:吴昌学

(上接第 1280 页)

A 为术前 X 线胸片, B 为术前 CT, C 常规病理学表现为肿瘤细胞较单一,由梭形、短梭形及卵圆形细胞组成(100×); D 为免疫组织化学(40×)

图 1 肺恶性孤立性纤维性肿瘤

Fig. 1 Pulmonary malignant solitary fibrous tumor

并行常规行术中病例冰冻检查,以保证肿瘤完整切除及切缘阴性^[5]。SFT 中有 10%~20% 属于恶性或潜在恶性,病理检查结果为良性者也不能完全排除以后发展成恶性的可能^[6]。本病例术后随访 6 个月未见复发,长期疗效有待进一步随访观察。有报告认为可用近距离放疗以及光驱动治疗方法辅助治疗 SFT,疗效有待进一步探究^[7]。

4 参考文献

- [1] Robinson LA. solitary fibrous tumor of the pleura [J]. Cancer Control, 2006(4):264-269.
- [2] Poyraz A, Kilic D, Hatipoglu A, et al. Pedunculated solitary fibrous tumors arising from the pleura [J]. Monaldi Arch Chest Dis, 2006(3):165-168.
- [3] 李辉,陈自谦,姚丽青,等. 良恶性孤立性纤维瘤的影像

学诊断及病理对照 [J]. 实用放射科学杂志, 2012(4):519-522.

- [4] Rono O, Fillosso PL, Papalia E, et al. solitary fibrous tumor of the pleura; surgical treatment [J]. Cardiothorac Surg, 2001(3):182-189.
- [5] Mitchell JD. solitary fibrous tumor of the pleura [J]. Semin Thorac Cardiovasc Surg, 2003(3):305-309.
- [6] Aknsue T, Matsumoto K, Kizaki T, et al. solitary fibrous tumors in the extremity; case report and review of the literature [J]. Chin orthop Relat Res, 2003(11):236-244.
- [7] de Perrot M, Fischer S, Brundler MA, et al. solitary fibrous tumours of the pleura [J]. Ann Thorac Surg, 2002(1):285-293.

(2015-08-02 收稿,2015-09-22 修回)

编辑:吴昌学