人脑胶质瘤细胞体外培养与形态学观察*

刘来兵¹, 刘健^{1,2**}, 出良钊^{1,2}, 杨华^{1,2}, 李玉美²

(1. 贵州医科大学附属白云医院, 贵州 贵阳 550014; 2. 贵州医科大学, 贵州 贵阳 550004)

[摘要] 目的: 探讨人脑胶质瘤原代细胞体外培养的方法。方法: 手术切除脑胶质瘤患者的病灶组织, 采用机械分离胰酶消化法获取胶质瘤细胞, 倒置显微镜下观察胶质瘤细胞的形态学变化, 通过差速贴壁、反复传代、自然纯化法获得纯度高、生物性状稳定、增殖能力强的细胞株, 绘制细胞生长曲线, 免疫组织化学技术鉴定原代细胞及其纯度。结果: 培养成功的原代细胞贴壁生长状态好, 有明显的对数生长期; 恶性程度越高细胞增殖越快, 可传代培养, 胶质原纤维酸性蛋白(GFAP)染色阳性率达93%, 证明培养的细胞为纯度较高的胶质瘤细胞。结论: 机械分离胰酶消化法适合于体外胶质瘤细胞的原代培养。

[关键词] 神经胶质瘤; 胰酶; 消化; 细胞培养; 生长曲线; 免疫组织化学

[中图分类号] R739.41 **[文献标识码]** A **[文章编号]** 1000-2707(2016)01-0024-03

Culture of Primary Human Glioma Cells *in vitro* and Morphological Observation

LIU Laibing¹, LIU Jian^{1,2}, CHU Liangzhao^{1,2}, YANG Hua^{1,2}, LI Yumei²

(1. Affiliated Baiyun Hospital of Guizhou Medical University, Guiyang 550014, Guizhou, China;

2. Guizhou Medical University, Guiyang 550004, Guizhou, China)

[Abstract] **Objective:** To probe the method of culturing primary human glioma cells *in vitro*. **Methods:** Glioma cells were obtained by mechanical separation and enzymatic digestion of glioma patients' focus tissue removed by surgical resection. The morphological changes of these glioma cells were observed under inverted microscope. The cell lines of high purity, biological traits stability, strong capacity of proliferation were obtained by differential speed stick wall, repeated passaging and natural purification. The cell growth curve was drawn and immunohistochemical technique was adopted to identify the primary cells and their purity. **Results:** The primary cells that were cultured successfully showed a good growing status of adhering to wall, apparent logarithmic growth period. The higher malignant degree of primary cells, the faster the proliferation. Those cells could be subcultured. The positive staining rate of glial fibrillar acidic protein (GFAP) was up to 93%, proving the cultured cells were glioma cells of high purity. **Conclusion:** The human glioma cells can be cultured by mechanical separation and enzymatic digestion.

[Key words] glioma cells; pancreatin; digestion; cell culture; growth curve; immunohistochemistry

脑胶质瘤是发生于神经外胚层的恶性肿瘤, 在成人的发病率约为 6/10 万, 5 年生存率 20% ~ 30%^[1-3]。部分脑胶质瘤恶性程度高, 生存期短。

原代细胞刚从肿瘤组织中分离出来, 包含了肿瘤细胞的各种信号, 生物学特性没有发生很大的变化, 仍保留原来的遗传学特性, 这样培养出的肿瘤细胞

* [基金项目] 国家自然科学基金(81560409); 贵阳市社会发展与民生科技计划 [筑科合同(2012)103.39 号]; 贵州省科技局联合基金 [黔科合 LG 字(2012)069 号]; 教育部“创新团队发展计划” [国家教育部科技司(教技函 509-IRT13058)]

** 通信作者 E-mail: 136721361@qq.com

网络出版时间: 2016-01-07 网络出版地址: <http://www.cnki.net/kcms/detail/52.5012.R.20160107.2042.050.html>

与在体肿瘤细胞的真实状态最接近,是研究抗肿瘤药物作用机制及肿瘤基因表达的理想细胞模型^[4]。

1 材料与方 法

1.1 材 料

1.1.1 标本来源

收集 2011 年 10 月~2012 年 3 月 15 例脑胶质瘤患者新鲜手术标本进行细胞培养,所取标本征得患者或家属的知情同意,所有标本经术后病理检查确诊。其中男 9 例,女 6 例,22~67 岁,平均 45.2 岁。按 WHO(2007)中枢神经系统肿瘤分类标准^[5]:星形细胞瘤 6 例(Ⅱ级),间变性星形细胞瘤 6 例(Ⅲ级),胶质母细胞瘤 3 例(Ⅳ)。

1.1.2 实验仪器及试剂

CO₂ 培养箱(日本 SANYO),DMEM/F12(Hyclone 公司),鼠抗人 GFAP(武汉博士德),SABC 试剂盒(北京中杉金桥)等。

1.2 方 法

1.2.1 原代细胞培养 将手术切除的新鲜肿瘤标本(选择肿瘤细胞丰富的实质,避开与正常组织交界区、钙化处、出血、坏死液化区)放入含双抗的 DMEM/F12 培养液的瓶中,冰浴下立即送实验室;镜下选取较单纯的肿瘤组织(剔除坏死组织和血管等组织),眼科剪剪成约 1 mm³ 小块,研磨约 1 min,滴加适量的胰酶-EDTA(0.02% EDTA 及 0.25% 胰蛋白酶)37℃ 消化 5 min,终止消化后用吸管轻轻吹打,使细胞尽量分散,用 200 目不锈钢筛网过滤;过滤后的悬液离心、重悬,按 5×10⁴/mL 接种于 50 mL 的培养瓶,培养 30 min 后,将细胞悬液移至另一培养瓶中,去除成纤维细胞,48 h 后更换培养液,弃除未贴壁细胞,以后每 3 d 换液 1 次。倒置相差显微镜下观察不同时期细胞的生长情况并照相。

1.2.2 传代及纯化细胞 细胞融合达 80%~90% 后,滴加胰酶-EDTA(0.02% EDTA 及 0.25% 胰蛋白酶)37℃ 消化,当观察到细胞突起回缩、形态变圆、细胞间隙变大,约有 80% 细胞漂浮时,加入等体积的含 10% FBS 的 DMEM/F12 完全培养基中止消化;按 1:2 传代,经多次传代扩增培养,使细胞逐渐得到纯化和扩增。

1.2.3 细胞生长曲线的测定 取已铺满培养瓶底的胶质瘤细胞,消化后以 5×10⁴ 个/mL 的密度接

种于 24 孔培养板。每 24 h 取 3 孔进行细胞计数,连续 7 d,以细胞数量为纵坐标,时间为横坐标绘制细胞生长曲线。按 Patterson 公式计算细胞倍增时间为: $Td = t \lg 2 / \lg(Nt / No)$,其中 Td 为倍增时间(h), t 为细胞数由 No 增至 Nt 所需的时间, No 为接种时的细胞数, Nt 为培养 t h 后的细胞数。

1.2.4 鉴定肿瘤细胞 收获 P₃ 代生长状态良好的细胞,4% 多聚甲醛液固定,滴加相应的 GFAP 一抗(滴度 1:100),4℃ 过夜,滴加相应的二抗,DAB 显色,脱水,透明,中性树胶封片,在高倍镜下(400×)随机选取 10 个视野,计数 1 000 个肿瘤细胞中阳性肿瘤细胞所占的百分率。

2 结 果

2.1 人胶质瘤原代培养细胞

接种后 48 h 换液,去除不贴壁的细胞和碎片后,镜下可见单个分散或数个克隆样贴壁的细胞,形态较为均匀,呈棱形伸展状态或多边形,以棱形细胞为主(图 1A);第 3 天可观察到贴壁细胞有分裂增殖,细胞数目增加明显,肿瘤细胞形态多样,呈棱形、三角形、多角形等,细胞轮廓清晰(图 1B)。4~5 d 原代培养的细胞逐渐形成分散的细胞集落(图 1C),于培养 6~7 d 天渐渐铺满培养瓶底,细胞达 90% 融合(图 1D),呈铺路石样排列,恶性程度越高细胞增殖越快。

2.2 传代及纯化细胞

培养的细胞达 90% 左右融合时,消化传代。传代的细胞形态与原代相似,传代细胞生长潜伏期短,接种 2~3 h 后即贴壁伸展,逐渐恢复为棱形,12~24 h 完全贴壁,传代后的细胞增殖速度较快,3~5 d 即可传代 1 次,且细胞形态单一均匀,呈铺路石样排列(图 2A、2B)。

2.3 细胞生长曲线

生长曲线显示细胞接种第 2 天后细胞进入对数生长期,第 3~5 天为对数生长期,培养第 7 天细胞增殖达到高峰,第 7 天后细胞生长进入平台期,见图 3。

2.4 第 3 代人胶质瘤细胞鉴定

原代培养的人胶质瘤细胞经纯化传代至第 3 代时,绝大多数肿瘤细胞胶质原纤维酸性蛋白(GFAP)染色阳性,细胞胞浆呈现棕黄色颗粒,阳性率达 93%,证实所培养的细胞为胶质瘤细胞(图 4A、B)。

注:A 为培养 48 h(200 ×),B 为培养第 3 天(200 ×),C 为培养第 5 天(200 ×),D 为培养第 7 天(100 ×)

图 1 原代培养的胶质瘤细胞

Fig. 1 Primary cultured glioma cells

注:A 为第 3 代培养第 2 天(200 ×),

B 为第 3 代培养第 5 天(100 ×)

图 2 传代培养的胶质瘤细胞

Fig. 2 Subcultured glioma cells

图 3 胶质瘤细胞生长曲线图

Fig. 3 The glioma cell growth curve

注:A、B 分别为第 3 代培养第 5 天细胞 GFAP 的表达(SABC × 100, × 400)

图 4 第 3 代人胶质瘤细胞的 GFAP 表达

Fig. 4 The GFAP expression of the third generation cells cultured for 5 days

3 讨论

脑胶质瘤是颅脑肿瘤中最常见的一种,严重危害患者的健康。胶质瘤细胞的原代培养是直接取患者的肿瘤组织在体外进行扩增、培养,因刚从组织中分离,其生物学特性还未发生很大的变化,仍保留原来的遗传学特性,也最接近体内细胞的生长

特性^[6],适用于药物敏感试验、细胞分化等实验研究。国内外已有大量关于胶质瘤原代细胞培养的研究^[7-8],脑胶质瘤细胞的原代培养在胶质瘤研究的各个领域均得到广泛的应用。

原代细胞培养方法有酶消化法和组织块培养法,对方法的选择很多学者持有不同的观点^[9]。本实验先用研磨器研磨机械分离细胞,再加入胰酶短时间消化,不锈钢滤网过滤进行体外培养,这样既避开了单纯酶消化法步骤多、组织需要量大的缺点,还可以减轻长时间酶消化时对原代细胞的损伤作用;同时也摒弃了组织块培养法细胞周期很长、成功率低等缺点,很适合目前的科学研究的需要。

大量研究证实 GFAP 是一种由胶质细胞特异表达的中间丝细胞骨架蛋白,决定胶质细胞的结构和功能^[10]。细胞的恶性转化与细胞的形态改变密切相关,细胞形态一旦改变该细胞的生长特性与功能必发生改变。决定细胞形态的物质主要与细胞骨架有关。真核生物细胞的骨架主要由肌动蛋白、微丝及介于两者之间的中间丝三类网状蛋白质构成,其中以中间丝变异高,并显示出特异性的表达。目前 GFAP 是最常用于识别正常或病理情况下胶质细胞来源的一种特异性的蛋白质^[11]。本实验在倒置显微镜下观察到体外原代培养细胞形态多样,有梭形、三角形、多角形,以梭形为主,这与众多文献报告的原代胶质瘤细胞的形态相符,且通过传代的纯化,细胞形态逐渐均匀、单一,以梭形为主。选用第 3 代细胞生长状态良好的胶质瘤细胞采用免疫组织化学的方法检测胶质细胞特异性的标志物 GFAP 的表达,结果显示肿瘤细胞高度表达 GFAP,胞质染成棕黄色,阳性细胞率达 93%,证明所培养

的细胞为胶质瘤细胞,且纯度较高。本实验采用机械分离胰酶消化法成功培养出人脑胶质瘤细胞,为下一步深入研究胶质瘤的生物学特性及体外药物敏感性试验、动物验证实验等奠定了基础。

(下转第 31 页)

- tal differences in hyperoxia-induced oxidative stress and cellular responses in the murine lung[J]. *Free Radic Biol Med*, 2013(61):51-60.
- [3] 胡良冈,钱燕,龚永生. SPF 级新生大鼠高氧肺损伤模型的建立[J]. *中国实验动物学报*, 2008(6):441-443.
- [4] Makena PS, Gorantla VK, Ghosh MC, et al. Lung injury caused by high tidal volume mechanical ventilation and hyperoxia is dependent on oxidant-mediated c-Jun NH2-terminal kinase activation[J]. *J Appl Physiol*, 2011(5):1467-1476.
- [5] Park HS, Kim SR, Lee YC. Impact of oxidative stress on lung diseases[J]. *Respirology*, 2009(1):27-38.
- [6] Tasaka S, Amaya F, Hashimoto S, et al. Roles of oxidants and redox signaling in the pathogenesis of acute respiratory distress syndrome[J]. *Antioxid Redox Signal*, 2008(4):739-753.
- [7] Zhao LQ, Leung JK, Yamamoto H, et al. Identification of P311 as a potential gene regulating alveolar generation[J]. *Am J Resp Cell Mol*, 2006(10):48-54.
- [8] Pan D, Zhe X, Jakkaraju S, et al. P311 induces a TGF-beta 1-independent, nonfibrogenic myofibroblast phenotype[J]. *J Clin Invest*, 2002(9):1349-1358.
- [9] Fujitani M, Yamagishi S, Che YH, et al. P311 accelerates nerve regeneration of the axotomized facial nerve[J]. *J Neurocherrt*, 2004(3):737-744.
- [10] Erhardt JA, Pittman RN. Ectopic p21 WAF 1 expression induces differentiation-specific cell cycle changes in PCI 2 cells characteristic of nerve growth factor treatment[J]. *J Biol Chem*, 1998(7):23517-23523.
- [11] Paliwal S, Shi J, Dhru U, et al. P311 binds to the latency associate protein and downregulates the expression of TGF-beta1 and TGF-beta2[J]. *Biochem Biophys Res Commun*, 2004(4):1104-1109.
- [12] Mariani LW, McDonough S, Hoelzinger DB, et al. Identification and validation of P311 as glioblastoma invasion gene using laser capture micro-dissection[J]. *Cancer Res*, 2001(5):4190-4196.
- [13] Fang MZ, Liu C, Song Y, et al. Overexpression of gastrin-releasing peptide in human esophageal squamous cell carcinomas[J]. *Carcinogenesis*, 2004(6):865-871.
- [14] 张向峰,朱光发,刘双,等. 基质金属蛋白酶-2/9 及其组织抑制剂比例失衡在高氧所致急性肺损伤中的作用[J]. *中国危重病急救医学*, 2008(10):597-600.
- [15] Perkowski S, Scherpereel A, Murciano JC, et al. Dissociation between alveolar transmigration of neutrophils and lung injury in hyperoxia[J]. *Am J Physiol Lung Cell Mol Physiol*, 2006(5):1050-1058.

(2015-07-20 收稿,2015-10-07 修回)
中文编辑:刘平;英文编辑:刘华

(上接第 26 页)

4 参考文献

- [1] 李剑,郑莉莉,王建祯. 脑胶质瘤细胞体外原代培养化疗药物敏感性研究[J]. *中国实用神经疾病杂志*, 2011(6):13-15.
- [2] Hargrave DR, Zacharoulis S. Pediatric CNS tumors: current treatment and future directions[J]. *Expert Rev Neurother*, 2007(8):1029-1042.
- [3] 袁勇,黄晓斌,廉坤,等. 适度低氧微环境对体外培养脑胶质瘤干细胞生长的影响[J]. *昆明医科大学学报*, 2015(6):22-25.
- [4] 方川,檀艳丽,王佳良,等. 人脑胶质瘤原代细胞培养及体外药物敏感度的实验[J]. *肿瘤防治研究*, 2010(12):1380-1383.
- [5] 杨学军. 解读《世界卫生组织中枢神经系统肿瘤分类(2007年)》[J]. *中国神经精神疾病杂志*, 2007(9):513-517.
- [6] 杨继红,张革化,魏燕,等. 酶消化分离法原代培养人鼻黏膜上皮细胞的改进[J]. *临床耳鼻咽喉头颈外科杂志*, 2009(23):1066-1068.
- [7] 周蓉,滕晓华,曾瑜,等. 星形胶质瘤细胞的分离培养及生物学特性观察[J]. *国际神经病学神经外科学杂志*, 2009(6):495-499.
- [8] 李晓良,孙王伟,张曙光,等. miR-125b 对胶质瘤细胞侵袭能力影响的体内研究[J]. *临床神经外科杂志*, 2014(2):90-93.
- [9] 刘国红,柴玉荣,朱晓燕,等. 连续微量培养液胃癌组织块贴壁培养法[J]. *肿瘤防治研究*, 2008(2):147-148.
- [10] 袁彬,李彤. 转化生长因子 $\beta 1$ 对体外大鼠星形胶质细胞形态及胶质纤维酸性蛋白表达的影响[J]. *第四军医大学学报*, 2007(16):1456-1458.
- [11] Perng MD, Wen SF, Gibbon T, et al. Glial fibrillary acidic protein filaments can tolerate the incorporation of assembly-compromised GFAP-delta, but with consequences for filament organization and alphaB-crystallin association[J]. *Mol Biol Cell*, 2008(10):4521-4533.

(2015-09-27 收稿,2015-11-05 修回)
中文编辑:周凌;英文编辑:刘华